

常見注射途徑及最大注射量

種類	肌肉內	靜脈內	皮下	腹腔	皮內	經口
小鼠	後肢肌肉 ≤ 25G 0.05ml	外側尾靜脈 或隱靜脈 ≤ 26G 0.2ml	後背側頸部 或胸部 ≤ 23G 3ml	右下四分之 一腹部 ≤ 23G 3ml	胸部皮膚或 腹部皮膚 ≤ 23G 0.05ml	18-22G ; 2-3cm 5-10ml/kg
大鼠	後肢肌肉 ≤ 23G 0.1 ml	外側尾靜脈 或隱靜脈 ≤ 23G 2.5 ml	後背側頸部 或胸部 ≤ 21G 10 ml	右下四分之 一腹部 ≤ 23G 5-10 ml	胸部皮膚或 腹部皮膚 ≤ 21G 0.05ml	15-18G ; 6-8cm 5-10ml/kg
倉鼠	後肢肌肉 ≤ 24G 0.1ml	股靜脈,頸靜 脈 < 25G 0.3ml	後背側頸部 或胸部 ≤ 21G 3-4ml	右下四分之 一腹部 ≤ 23G 3-4ml	胸部皮膚或 腹部皮膚 ≤ 21G 0.05ml	18G ; 4-4.5cm 5-10ml/kg
天竺鼠	後肢肌肉 ≤ 24G 0.3ml	耳靜脈或隱 靜脈 ≤ 27G 0.5ml	後背側頸部 或胸部 ≤ 20G 5-10ml	右下四分之 一腹部 ≤ 23G 5-8ml	背側胸部皮 膚 ≤ 20G 0.05-0.1ml	
兔子	後肢肌肉或 腰側肌肉 ≤ 23G 0.5-1 ml	邊緣耳靜脈 或頸靜脈 ≤ 21G 2.5 ml/kg	後背側頸部 或胸部 ≤ 21G 5-10 ml	不常見 ≤ 21G 10 ml/kg	胸部皮膚或 腹部皮膚 ≤ 21G 0.1ml	